vertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Grandes cultures

N° 6 - 17 AOUT 1987

MAIS (en collaboration avec le SUAD de l'HERAULT)

PYRALE = Traitement contre la deuxième génération

ACARIENS = Présence de foyers importants

PYRALE : Deuxième génération en cours.

Les sorties de papillons femelles en cage d'élevage ont commencé les 8-10 août.

En plein champ, les dépôts de pontes sont très progressifs. Les premières éclosions vont avoir lieu dans les prochains jours, mais l'essentiel des sorties ne se produira certainement pas avant le 23-25 août.

Dans les parcelles de mais semence concernées par ce ravageur :

• Réalisez un traitement dès réception avec l'un des produits suivants : FASTAC, DECIS, SUMICIDIN, KARATE, ou d'une spécialité à base de cypermethrine.

ACARIENS: Les attaques peuvent être très importantes dans certaines parcelles mal protégées jusqu'à présent.

Si nécessaire, effectuez sans tarder l'application d'un acaricide : PLICTRAN, DANITOL, MAÎTAC,...

Ce produit sera utilisé seul, ou éventuellement associé à la spécialité destinée à lutter contre la Pyrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



